

## ILLINOIS SCHOOL CODE REQUIREMENTS FOR IMMUNIZATIONS

**Diphtheria-Pertussis-Tetanus (DPT/DTaP)** – Three or more doses of DPT/DTaP, or Td, with the last dose qualifying as a booster and received on or after the 4th birthday. Students entering 6th through 12<sup>th</sup> grade must show proof of receiving one Tdap vaccine.

**Poliomyelitis- Oral Polio (OPV) or Inactivated Polio Vaccine (IPV)** – Must have received three or more doses of polio vaccine defined as oral poliovirus vaccine (OPV) or inactivated poliovirus vaccine (IPV). If a combination of OPV and IPV was received, must show proof of having at least four doses. Doses in the series must have been received no less than four weeks (28 days) apart, with the last dose having been received on or after the fourth birthday.

**Measles (Red, Hard, or Two Week)** – **Two doses of measles vaccine are required.** First dose must have been received on or after the first birthday. Second dose must have been received no less than four weeks (28 days) after the first dose. Immunization is not necessary if disease is confirmed by a physician's signature or adequate antibody titer.

**Rubella (German or 3-Day Measles)** – **Two doses of rubella vaccine are required.** First dose must have been received on or after the first birthday. Second dose must have been received no less than four weeks (28 days) after the first dose. Proof of disease by physician documentation **IS NOT ACCEPTABLE.** Adequate antibody titer is acceptable proof of disease.

**Mumps** – **Two doses of mumps vaccine are required.** First dose must have been received on or after the first birthday. Second dose must have been received no less than four weeks (28 days) after the first dose. Immunization is not necessary if disease is confirmed by a physician's signature or laboratory evidence of mumps immunity.

**Hepatitis B** – Minimum of three doses. The first two doses must have been received no less than four weeks (28 days) apart. The second and third doses must have been received at least two months apart. The first and third doses must have been received at least four months apart.

**Varicella (Chickenpox)** – Two doses of varicella vaccine are required. First dose must have been received on or after the first birthday. Second dose must have been received no less than four weeks (28 days) after the first dose. Immunization is not necessary if proof of prior varicella disease is confirmed by a physician's signature or laboratory evidence of varicella immunity.

**Meningococcal Disease-** Students entering 12<sup>th</sup> grade must show proof of receiving two meningococcal vaccines (MCV4). The first dose received on or after the 10th birthday; the second dose at least 8 weeks after the first dose. Only one dose is required if the first dose was received at 16 years of age or older. No proof of immunity allowed. Meningococcal B (Trumenba or Bexsero) vaccine **does not** meet the school code for the meningococcal vaccine.

## **REQUISITOS DEL CÓDIGO ESCOLAR DE ILLINOIS PARA INMUNIZACIONES**

**Difteria-Tos Ferina -Tétano (DPT/DTaP)** – Tres o más dosis de DPT/DTaP, o Td, con la última dosis calificando como refuerzo y recibida en, o después del 4º cumpleaños. Los estudiantes que van a ingresar de 6º a 12º grado deben mostrar la prueba de haber recibido una vacuna de Tdap.

**Poliomielitis - Polio Oral (OPV) o Vacuna Inactivada contra la Poliomeilitis (IPV)** – Deben haber recibido tres o más dosis de la vacuna contra la polio definida como vacuna oral contra el poliovirus (OPV) o vacuna inactivada contra el poliovirus (IPV). Si se recibió una combinación de OPV y de IPV, deben presentar prueba de haber tenido al menos cuatro dosis. Las dosis en la serie deben haber sido recibidas con no menos de cuatro semanas (28 días) de diferencia entre una y otra, habiendo recibido la última dosis en, o después del cuarto cumpleaños.

**Sarampión - Se requieren dos dosis de la vacuna contra el sarampión.** La primera dosis debe haber sido recibida en, o después del primer cumpleaños. La segunda dosis debe haber sido recibida no menos de cuatro semanas (28 días) después de la primera dosis. La inmunización no es necesaria si la enfermedad se confirma mediante la firma de un médico o un título adecuado de anticuerpos.

**Rubéola – Se requieren dos dosis de la vacuna contra la rubéola.** La primera dosis debe haber sido recibida en, o después del primer cumpleaños. La segunda dosis debe haber sido recibida no menos de cuatro semanas (28 días) después de la primera dosis. La prueba de la enfermedad mediante la documentación del médico **NO ES ACEPTABLE**. El título adecuado de anticuerpos es una prueba aceptable de la enfermedad.

**Paperas - Se requieren dos dosis de la vacuna contra las paperas.** La primera dosis debe haber sido recibida en, o después del primer cumpleaños. La segunda dosis debe haber sido recibida no menos de cuatro semanas (28 días) después de la primera dosis. La inmunización no es necesaria si la enfermedad es confirmada por la firma de un médico o evidencia de laboratorio de inmunidad a las paperas.

**Hepatitis B** - Mínimo de tres dosis. Las dos primeras dosis deben haber sido recibidas no menos de cuatro semanas (28 días) de diferencia entre una y otra. La segunda y la tercera dosis deben haber sido recibidas con al menos dos meses de diferencia entre una y otra. La primera y la tercera dosis deben haber sido recibidas con al menos cuatro meses de diferencia entre una y otra.

**Varicela (Chickenpox)** - Se requieren dos dosis de la vacuna contra la varicela. La primera dosis debe haber sido recibida en, o después del primer cumpleaños. La segunda dosis debe haber sido recibida no menos de cuatro semanas (28 días) después de la primera dosis. La inmunización no es necesaria si la prueba de la presencia previa de la varicela se confirma mediante la firma de un médico o pruebas de laboratorio de inmunidad contra la varicela.

**Enfermedad Meningocócica** - Los estudiantes que van a ingresar al 12º grado deben mostrar la prueba de haber recibido dos vacunas meningocócicas (MCV4). La primera dosis recibida en, o después del 10º cumpleaños; la segunda dosis al menos 8 semanas después de la primera dosis. Sólo se requiere una dosis si la primera dosis se recibió a los 16 años de edad o mayor. No se permite ninguna prueba de inmunidad. La vacuna contra el meningococo B (Trumenba o Bexsero) **no** cumple con el código de la vacuna meningocócica.